

شماره بازنگری: A صفحه: 1 از 1 تاریخ: 94/2/7	عنوان سند فرم درخواست داروی آلبومین شماره سند: DC-FO-02	
---	---	---

شماره پرونده:	تاریخ:/...../.....
نام و نام خانوادگی:	وزن:
سن:	بخش:
علت بستری:	
اطلاعات دریافت آلبومین	
سطح آلبومین:	سطح پروتئین تام:
دوز و طول مصرف وکل آلبومین:	
اندیکاسیون تجویز آلبومین	
0	پلاسمافرز - خط اول همزمان با تبادل حجم بالای پلاسما (بیشتر از 20 ml/kg در یک جلسه یا بیشتر از 20 ml/kg در مجموع چند جلسه در هفته)
0	پاراسنتز بیش از 4 لیتر (8 گرم آلبومین به ازای هر لیتر مایع خارج شده)
0	SBP (آلبومین به میزان 1.5 gr / kg در زمان تشخیص و 1 gr / kg در روز سوم + آنژی پویتی)
0	سوختگی - در صورت برقراری تمام شرایط ذیل: - سوختگی بیش از 50 درصد سطح بدن - حداقل 24 ساعت از زمان سوختگی گذشته باشد - با مصرف محلولهای کریستالوئیدی کاهش حجم بیمار اصلاح نشده باشد
0	سندرم کبدی - کلوی آلبومین 1 gr / kg در زمان تشخیص و سپس 20-40 gr/day + مصرف داروهای موثر بر عروق
0	سندرم نفروپاتی (تنها در Alb < 2 g/dL همراه با هایپوولمیلی و لیادم ری)
0	پهوند عضو (کبد) - در صورت برقراری تمام شرایط ذیل: - آلبومین سرم کمتر از 2.5 g/dl - PCWP کمتر از 12mmHg - هماتوکریت بیش از 30 درصد
0	آسیت (تنها در صورتیکه به دیورتیک ها پاسخ ندهد)
0	شوگ هموراژیک - خط سوم و تنها در صورت عدم پاسخ به کریستالوئیدها
0	جراحی رتروپریوتون - آنوریکسم آئورت - پهوند عروق - پارگی لیبرش رگ لنفاوی (thoracic duct)
0	جراحی های بزرگ (نبایع بالافاصله بعد از عمل تجویز شود و تنها در صورت Alb < 2 g/dL بعد از اصلاح حجم در گردش خون)
0	بهاران مبتلا به اسهال که قادر به تحمل تغذیه خوراکی نیستند

شماره بازنگری: A صفحه: 1 از 1 تاریخ: 94/2/7	عنوان سند فرم درخواست داروی آلبومین شماره سند: DC-FO-02	
---	---	---

• دفع اسهال $<2L/day$ • آلبومین سرم $>2g/dl$ • ادامه یافتن اسهال علی‌غم مصرف مواد معدنی و پیچیدگی‌های زنجیره کوتاه	
درخواست خارج از گائید لاین فوق با ارایع مستندات :	
مواردی که مصرف آلبومین توصیه نمی شود	
Alb $> 2.5 g/dL$	
مداخله تغذیه ای و سوء تغذیه و سوء جذب	
سندرم کبدی-کلهوی قریب الوقوع	
پانکراتیت حاد و مزمن	
سندرم تحرک بیش از حد تخمدان	
آسپتی که به دیورتیک پاسخ می دهد	
24 ساعت اول بعد از سوختگی (به دلیل تراوش موی گی آلبومین)	
آنمی شدید	
ایسکمی مغزی	
همودیلیز	
شوک غنی هموراژیک	

$\text{Dose (g)} = [\text{desired Alb concentration (2.5 g/dL)} - \text{actual albumin concentration}] * 0.8 * \text{Kg}$

Refrence:

Caraceni P et al .clinical use of albumin .bloof transfuse,2013;11suppl 4:s18-25 -
 Liunbruno G et al .recommendations for the use of albumin and immunoglobulins -
 .bood transfuse ,2009;7: 216-34

مهر و امضا پزشک معالج	مهر پرستار	مهر و امضا داروساز